


KUŽELOSEČKY


Rozšíření konstrukcí kuželoseček

Hyperbola

Věta: Součin úseků na kolmici k hlavní ose hyperboly, měřených od bodů hyperboly k jejím asymptotám, je konstantní a rovná se čtverci vedlejší poloosy hyperboly.




Příklad 1: Hyperbola je dána asymptotami p, q a bodem M . Určete poloosy.



- 1) osy pólí úhel asymptot
- 2) $M \in m \perp o_1$
- 3) $m \cap p, q \rightarrow P, P'$
- 4) $m \cap o_1 = R$
- 5) $k \equiv (R; |RP|)$
- 6) $|MP| \cdot |MP'| = b^2$ (viz Euklidova věta)
- 7) $C \in o_2$ ve vzd. b od S
- 8) $l \cap p, q \rightarrow$ „charakteristický obdélník“


Obecně: Součin úseků na sečnách hyperboly rovnoběžných s jednou její osou, vymezených na ní bodem a asymptotami, je konstantní a roven čtverci této poloosy.

Příklad 5: Sestrojte parabolu, známe-li směr osy s_0 , $t+T, M$.



- 1) $|TM|/2=U$
- 2) $s'_0, s'_0 \parallel s_0, U \in s'_0$
- 3) $P = s'_0 \cap t$
- 4) $t' = PM$
- 5) převedeno na zadání příkladu 4.

Příklad 6: Sestrojte parabolu, známe-li s_0, t_1, T_1, t_2 .



- 1) $s'_0, P \in s'_0, s'_0 \parallel s_0$
- 2) $T_2, x = d(T_1, s'_0) = d(T_2, s'_0)$
- 3) převedeno na zadání příkladu 4.